



## CHAMPAGNE ARDENNE

Bulletin N° 226 du 21/12/93

d'après des observations du 15 au 20/12/93

### COLZA

Repos végétatif.

#### Altises et charançon du bourgeon terminal

Des dissections sur 50 pieds ont été réalisées dans les parcelles régulièrement suivies par notre service ainsi que dans des parcelles prises au hasard. Nous constatons quelques larves d'altises et surtout de charançon du bourgeon terminal. Peu de dégâts de mouche du chou.

Lieu % de pieds touchés par

	altises	C.B.T.
Réseau P.V.		
Cauroy Hermonville	0%	0%
Les Petites Loges	0%	0%
Crugny	0%	0%
Hannogne St Rémy	0%	0%
Pévy	0%	0%
Ville/Arce	1%	15%
Autres parcelles		
Avalleur	8%	24%
Bar/Seine	0%	4%
Arrelles	0%	0%
Balnot la Grange	4%	4%
Virloup	0%	0%
Vendeuvre/Barse	0%	4%
Maisons Chaource	0%	0%
Vezilly	0%	6%
Arcis le Ponsart	0%	20%
Olizy	0%	0%
St Hilaire le Grd	0%	0%
Machault	0%	6%
Bourgogne	0%	10%
Marfaux	0%	0%

Lors du précédent bulletin, nous vous signalions que nous n'avions observé aucune nouvelle ponte suite au 2ème vol. Cependant lors de ces comptages, nous avons pu remarquer quelques pontes récentes de charançon du bourgeon terminal, en particulier dans des parcelles témoins d'essais (Ville/Arce et Avalleur). Un traitement de rattrapage avec un produit huileux est conseillé si 60 à 70 % des pieds présentent au moins une larve d'altise ou de charançon du bourgeon terminal. Mais ces traitements n'ont qu'une efficacité réduite (50 à 60 %) et sont à réaliser par température supérieure à 10°C sur des larves jeunes.

■ Comme les populations larvaires sont très en dessous des seuils de traitement, aucun traitement de rattrapage n'est con-

seillé dans la plupart des cas que nous avons observés.

#### Larves d'altises

Localisation : dans les pétioles.

Caractéristiques :

larve de forme al-

longée, blanche,

avec les deux extrémités noires et trois paires de pattes.

#### Larves de mouche du chou

Localisation : le plus souvent au niveau du pivot, parfois dans les pétioles.

Caractéristiques : son stylet à l'avant.

Aucune efficacité des traitements sur larve de mouche.

#### Larves de charançon du bourgeon terminal

Localisation : dans les pétioles et au niveau du bourgeon terminal.

Caractéristiques : dodues, sans patte, une extrémité noire.

### CEREALES

2 feuilles à tallage.

#### Dégâts de gel

Aucun dégât n'a été constaté sur les cultures. Les chutes de température n'ont été ni brutales, ni trop importantes ce qui a permis aux céréales de bien résister, même au stade critique coléoptile.

## TOUTES CULTURES

#### Petits rongeurs

On peut constater qu'après le gel de novembre, l'activité des campagnols des champs et des mulots a repris de façon intensive ces dernières semaines.

■ Se reporter au bulletin n° 219 du 23/09/93 pour la lutte qui doit être avant tout collective (sur de grandes surfaces) pour présenter une réelle efficacité de façon durable.

*Joyeux Noël  
et bonnes fêtes  
de fin d'année*

\*\*\*\*\*

En Bref...

**COLZA : comptages des dégâts d'insectes.**
**CEREALES : pas de dégâts de gel.**
**TOUTES CULTURES : campagnols et mulots.**

741